

# WANNEER PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN DRAGEN?



Vlaanderen  
is zorg

## Zorgpersoneel

	Zorgverlener heeft zelf géén symptomen van COVID-19 en is niet in nauw contact geweest met COVID-19 patiënt	Zorgverlener met respiratoire symptomen die kunnen wijzen op COVID-19		Zorgverlener zonder respiratoire symptomen, maar nauw contact (gezinslid) van COVID-19 patiënt	
		Zorgverlener heeft géén koorts	Zorgverlener met koorts: wordt getest		
			COVID-19 test is <b>negatief</b>		COVID-19 test is <b>positief</b>
		Mag werken mits chirurgisch masker en extra aandacht voor handhygiëne	Mag werken mits chirurgisch masker (masker tot alle symptomen verdwenen zijn)	Mag pas werken minstens 7 dagen na ontstaan klachten EN 3 dagen koortsvrij mits chirurgisch masker tot verdwijnen symptomen	Mag werken maar draagt een chirurgisch masker tot 14 dagen na nauw onbeschermd contact
<b>Direct contact met (mogelijke) COVID-19 patiënt</b>		Chirurgisch masker Handschoenen Beschermschort met lange mouwen Beschermbрил bij kans op spatten en bij hoestende/niezende patiënt			
<b>Direct contact met bewoner/cliënt zonder symptomen van COVID-19</b>	Geen specifieke beschermingsmiddelen	Zorgverlener draagt chirurgisch masker omwille van eigen respiratoire symptomen		Zorgverlener draagt masker tot 14 dagen na nauw onbeschermd contact omwille van eigen mogelijke besmetting.	

### OPMERKINGEN:

- » De algemene voorzorgsmaatregelen die ook buiten corona-epidemie gelden zijn uiteraard van toepassing (zoals handhygiëne, indicaties voor handschoenen dragen,...)
- » FFP2 maskers zijn voorbehouden om te dragen bij aërosolgenererende procedures die quasi nooit in een woonzorgcentrum voorkomen.
- » Surf naar [www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19-hygiene-en-bescherming](http://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19-hygiene-en-bescherming) voor meer info over het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.